

Guía para el indicador 05a de la KoGe (versión 22.7.21)

<p><i>Número de personas a las que llegan las medidas de prevención sanitaria (Prevención) (ver COSUDE Salud ARI 2 - indicador de referencia agregable)</i></p>	
<p>Efecto a largo plazo 2 (long-term outcome)¹: Derechos a los servicios económicos y básicos (ODS 1.4) Efecto a corto plazo 2.2 (short-term outcome): La atención primaria de salud de calidad es accesible para tod@s, especialmente para l@s más vulnerables y marginad@s. Producto 2.2a (output)²: Grupos marginados y vulnerables que logran acceder a una atención primaria de salud de buena calidad Indicador 05 consta de 3 sub-indicadores: Indicador 05a (Prevención), Indicador 05b (Tratamiento de atención/cuidado), Indicador 05c (cuidado nacimiento)</p>	
Tipo	Periódico (evaluación a lo largo del tiempo)
Definiciones técnicas	<p>Las medidas de prevención de la salud incluyen una amplia gama de actividades o intervenciones destinadas a reducir los riesgos o amenazas a la salud y el bienestar, incluidas las actividades de promoción de la salud³. La promoción de la salud es el proceso de empoderar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y sus determinantes a través de los esfuerzos de alfabetización en salud y la acción multisectorial para aumentar los comportamientos saludables⁴. Las medidas de prevención de la salud se pueden clasificar en intervenciones primarias, secundarias y terciarias. Aquí, nos enfocamos en intervenciones primarias y secundarias. Las intervenciones terciarias son relevantes para indicador 05b (Tratamiento de atención).</p> <p>Las actividades de prevención primaria incluyen acciones dirigidas a evitar la manifestación de una enfermedad. <i>Ejemplos</i> son la educación sobre comportamientos saludables y seguros, vacunación, etc.</p> <p>La prevención secundaria tiene como objetivo reducir el impacto de una enfermedad o lesión que ya ha ocurrido. Esto se hace detectando y tratando la enfermedad lo antes posible para detener o retrasar su progreso y prevenir problemas a largo plazo. <i>Ejemplos</i> incluyen terapias con medicamentos preventivos, detección y / o asesoramiento, etc.</p> <p>La prevención terciaria tiene como objetivo suavizar el impacto de una enfermedad en curso que tiene efectos duraderos. Esto se hace ayudando a las personas a manejar problemas de salud a largo plazo, a menudo complejos (por ejemplo, enfermedades crónicas, deficiencias permanentes) para mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida. Los ejemplos incluyen programas de manejo de enfermedades crónicas, etc. Las actividades de prevención terciaria están excluidas aquí, pero son relevantes para indicador 05b (Tratamiento de atención).</p> <p>Todas las medidas de prevención de la salud se pueden clasificar en cuatro grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sobre ENT (diabetes, obesidad, drogadicción, salud mental, etc.) (= SDC ARI 2) b) en EC (malaria, ETS como VIH, lepra, enfermedades respiratorias como TB o Covid-19, enfermedades relacionadas con WASH, etc.)

¹ Efecto representa el conjunto de resultados a corto, mediano y largo plazo probables o logrados por los productos de una intervención (OCED 2010, ajustado).

² Output comprende el producto y servicio que resulta de una actividad; puede incluir también el cambio resultante de la actividad que es pertinente para el logro de efectos directos (OCED 2010).

³ <https://www.iwh.on.ca/what-researchers-mean-by/primary-secondary-and-tertiary-prevention>

⁴ <http://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/health-promotion-disease-prevention.html>

	<p>c) sobre salud maternoinfantil (anticoncepción, embarazo en la adolescencia, visitas prenatales y posnatales, etc.) d) vacunación</p> <p>Definiciones e información sobre ENT y EC: consulte la Guía del indicador 05b (Tratamiento de atención)</p> <p>La definición de personas a las que se llega depende del tipo de medidas de prevención sanitaria e <i>incluye</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas que asisten a un/a taller / formación / clase - Personas que asisten a una sesión de sensibilización, p. ej. en un hospital o en la comunidad - Personas que han sido vacunadas con éxito - Personas que han completado un cribado y / o reciben asesoramiento. <p>El indicador no considerará a la comunidad en general y excluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas a las que simplemente les gustó, guardaron, comentaron, respondieron, compartieron o siguieron una campaña en las redes sociales - Personas que acaban de recibir un folleto o volante - Personas que solo escuchan un programa de radio sobre prevención y / o promoción de la salud <p>L@s niñ@s son personas de 0 a 14 años, l@s jóvenes son personas de 15 a 24 años y l@s adult@s son personas mayores de 25 años.</p>
<p>Justificación, buena realización, interpretación de resultados</p>	<p><i>No definidas</i></p>
<p>Línea de base</p>	<p>El valor de la línea de base es siempre 0.</p>
<p>Recopilación de datos</p>	<p>Datos requeridos <i>No definidos</i></p> <p>Herramientas de recopilación de datos <i>No definidas</i></p> <p>Desagregación de datos <u>Requerido:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Por sexo - Por grupo de edad (nin@s, jóvenes, adult@s) <p><u>Opcional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ENT, EC, SMI y vacunación - Niñ@s pequeñ@s (0-5 años) <p>Frecuencia Anual</p>

Informe de datos	Ene/Feb: la organización de implementación local envía los datos a la coparte suiza utilizando la última versión de la "Herramienta de informe y aprendizaje del indicador"
Ejemplo trabajado	<i>No definido</i>