

## Directive pour l'indicateur clé 05b (version 22.1.24)

Nombre de consultations pour une maladie non transmissible (MNT) ou transmissible (MT)	
<p><b>Effet à long terme 2 (long-term outcome 2):</b> Droits aux services économiques et de base (SDG 1.4)</p> <p><b>Effet à court terme 2.2 (Short-term outcome 2.2):</b> Des soins de santé primaires de qualité sont accessibles à tous et toutes, en particulier aux personnes les plus vulnérables et marginalisées.</p> <p><b>Résultat 2.2a (Output 2.2a):</b> Les groupes marginalisés et vulnérables ont accès à des soins de santé primaires de bonne qualité.</p> <p><b>L'indicateur clé 05 se compose de 3 sous-indicateurs : KI 05a (prévention), KI 05b (soins et traitement), KI 05c (soins de naissance).</b></p>	
<b>Type</b>	Périodique (évaluation périodique au fil du temps)
<b>Définitions techniques</b>	<p>Le <b>traitement médical</b> fait référence à la gestion et aux soins d'un/e patient/e pour combattre une maladie ou un trouble. Il peut inclure l'utilisation d'un agent, d'une procédure ou d'un traitement, comme p.ex. un médicament, une intervention chirurgicale ou des exercices physiques.</p> <p>Les <b>maladies non transmissibles (MNT)</b>, également appelées maladies chroniques, ont tendance à être de longue durée et sont le résultat d'une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux. Les principaux types de MNT sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. D'autres comprennent la toxicomanie, les maladies mentales et l'obésité.</p> <p>Les <b>maladies transmissibles (MT)</b> ou infectieuses comprennent le paludisme, les maladies sexuellement transmissibles (MST) comme le VIH/sida, la lèpre, les maladies respiratoires comme la tuberculose (TB) ou le Covid-19, l'hépatite, les maladies liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène comme la diarrhée ou les maladies tropicales négligées.</p> <p>Les <b>enfants</b> sont des personnes âgées de 0 à 14 ans, les <b>jeunes</b> sont des personnes âgées de 15 à 24 ans et les <b>adultes</b> sont des personnes âgées de plus de 25 ans.</p>
<b>Justification</b>	L'accès aux traitements essentiels pour les MNT est généralement faible dans les pays à revenu faible et intermédiaire mais pourrait sauver de nombreuses vies et améliorer la santé et le bien-être de millions de personnes. L'augmentation du nombre de traitements pour les MNT et les MT indique un meilleur accès et une meilleure disponibilité des traitements essentiels et des soins de santé primaires de qualité en général.
<b>Bonne performance et interprétation des résultats</b>	<i>non définis</i>
<b>Ligne de base</b>	La ligne de base est toujours 0.
<b>Collecte de données</b>	<p><b>Données requises</b> <i>non définies</i></p> <p><b>Outils de collecte de données</b></p>

	<p><i>non définis</i></p> <p><b>Désagrégation des données</b>  <u>Requis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- par sexe</li> <li>- par âge</li> </ul> <p><u>Facultatif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- par MT/MNT</li> </ul> <p><b>Fréquence</b>            Annuellement</p>
<b>Reporting des données</b>	<p>Jan / Fév: l'organisation locale de mise en œuvre soumet les données au partenaire suisse, en utilisant la version la plus récente de l'«outil de reporting et d'apprentissage de l'indicateur».</p>
<b>Exemple détaillé</b>	<p><i>non défini</i></p>